ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie



Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une MII



Enfants de 12-23 mois avec les 8 vaccins recommandés (%)



Naissances des 3 dernières années ayant eu lieu dans un établissement de santé (%)



Mortalité infanto-juvénile ($_5q_0$) (décès des enfants de moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes)

USAID DU PEUPLE AMERICAIN
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET L'ACTION SOCIALE
Cellule de Lutte contre la Malnutrition
USAID DU PEUPLE AMERICAIN
CDC
L'Initiative Présidentielle des E.U. Contre le Paludisme
unicef
BANQUE MONDIALE
UNFPA
NUTRITION INTERNATIONAL
Nourish Life

Sénégal

Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) 2017

Ce rapport présente les principaux indicateurs de la cinquième phase de l'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue, 2017) au niveau national et des régions. Cette enquête a été exécutée d'avril à décembre 2017 par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) en collaboration avec le ministère de la Santé et l'Action Sociale (MSAS) et la Cellule de Lutte contre la Malnutrition. L'EDS-Continue 2017 a été réalisée avec l'appui financier du Gouvernement du Sénégal, de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), de Nutrition International (NI), et de la Banque Mondiale. Elle a bénéficié de l'assistance technique du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé (Demographic and Health Survey—The DHS Program, ICF) dont l'objectif est de collecter, d'analyser et de diffuser des données démographiques et de santé. Le Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de Médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le Laboratoire de Bactériologie et de Virologie de l'Hôpital Universitaire Aristide Le Dantec, ont apporté leur expertise à la réalisation de cette opération.

Sénégal : Prévalence de la contraception moderne et besoins non-satisfait en matière de planification familiale



Pour tous renseignements concernant l'Enquête Continue 2017, contacter :

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), Rocade Fann Bel-air Cerf-volant-B.P. 116, Dakar RP (Sénégal) ; téléphone : (221) 33 869 21 39/33 869 21 60, fax : (221) 33 824 36 15 ; e-mail : statsenegal@ansd.sn / statsenegal@yahoo.fr ; site web : www.ansd.sn.

Concernant The DHS Program, des renseignements peuvent être obtenus auprès d'ICF, 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, USA ; téléphone : +1-301-407-6500, fax : +1-301-407-6501 ; e-mail : info@DHSprogram.com ; site web : www.DHSprogram.com.

Tendance des indicateurs clés des Enquêtes de Démographie et Santé 2005-2017

	EDS		EDS-Continue				
INDICATEURS	2005	2010-11	2012-13	2014	2015	2016	**2017**
RÉPRODUCTION							
Indice synthétique de fécondité	5,3	5,0	5,3	5,0	4,9	4,7	**4,6**
Fécondité 15-19 (par mil)	101	93	80	90	80	72	**78**
Femmes 15-19 ayant commencé leur vie reproductive (%)	18,9	18,7	15,5	17,6	16,1	15,6	**16,4**
MORTALITÉ DES ENFANTS[1]							
Mortalité néonatale (NN)	35	29	26	19	23	21	**28**
Mortalité infantile ($_1q_0$)	61	47	43	33	39	36	**42**
Mortalité infanto-juvénile ($_5q_0$)	121	72	65	54	59	51	**56**
CONTRACEPTION							
Prévalence contraception total	11,8	13,1	17,8	22,2	23,3	25,1	**27,8**
Prévalence contraception moderne	10,3	12,1	16,1	20,3	21,2	23,1	**26,3**
Besoins non satisfaits en matière de planification familiale	32,0	30,1	29,2	25,6	25,2	23,6	**21,9**
SANTÉ DE LA RÉPRODUCTION							
Naissances des trois dernières années ayant eu lieu dans un établissement de santé (%)	61,8	72,8	71,3	76,9	74,5	75,9	**78,2**
Naissances des trois dernières années ayant été assistées par un prestataire formé (%)	51,9	65,1	50,5	59,1	53,2	58,6	**68,4**
SANTÉ DES ENFANTS							
Enfants 6-59 mois avec anémie (%)	82,6	76,4	71,2	60,3	66,3	66,1	**70,9**
Enfants 6-59 mois avec anémie sévère (%)	7,4	4,9	4,0	2,0	2,8	2,5	**2,8**
Enfants 12-23 mois avec tous les 8 vaccins recommandés (%)	58,7	62,8	70,2	73,7	68,0	69,8	**74,7**
NUTRITION							
Enfants de moins de 5 ans avec retard de croissance (%)	19,6	26,5	18,7	18,7	20,5	17,0	**16,5**
Enfants de moins de 5 ans émaciés (%)	8,5	10,1	8,8	5,9	7,8	7,2	**9,0**
Enfants de moins de 5 ans avec insuffisance pondérale (%)	14,2	17,7	15,7	12,6	15,5	13,5	**14,4**
PALUDISME							
Ménages possédant au moins une MII[2] (%)	20,3	62,9	72,8	74,4	76,8	82,4	**77,9**
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une MII[2]	7,2	34,5	45,8	43,2	55,4	66,6	**53,8**
Femmes enceintes ayant dormi sous une MII[2]	8,6	36,0	43,3	38,1	51,8	69,0	**54,1**
Prévalence du Paludisme TDR—Enfants 6-59 mois	0,2	2,7	3,4	1,1	0,6	0,9	**0,9**
Prévalence du Paludisme Microscopie—Enfants 6-59 mois	nd	2,9	2,8	1,2	0,3	0,9	**0,4**
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ENQUÊTÉE							
Femmes 15-49 ans sans instruction (%)	59,6	57,9	54,8	51,0	50,9	48,6	**46,2**
Hommes 15-49 ans sans instruction (%)	41,1	36,9	nd	37,7	36,8	36,4	**35,6**

[1] Basé sur les enfants nés au cours des dix années ayant précédé l'enquête ; [2] MII = Moustiquaire imprégnée d'insecticide

Les indicateurs clés de l'Enquête Démographique et de Santé Continue 2017, selon la région

	Région													
INDICATEURS	**Dakar**	**Ziguin-chor**	**Diourbel**	**Saint-Louis**	**Tamba-counda**	**Kaolack**	**Thiès**	**Louga**	**Fatick**	**Kolda**	**Matam**	**Kaffrine**	**Kédou-gou**	**Sédhiou**
RÉPRODUCTION														
Indice synthétique de fécondité	3,0	4,6	5,8	4,7	5,8	5,2	4,6	5,1	5,2	5,5	5,3	6,2	6,4	6,4
Fécondité 15-19 (par mil)	33	79	96	62	134	70	52	94	73	144	87	153	159	135
Femmes 15-19 ayant commencé leur vie reproductive (%)	9,0	14,4	17,9	12,0	30,1	19,5	11,2	16,9	15,5	29,8	22,4	26,1	38,5	23,5
MORTALITÉ DES ENFANTS[1]														
Mortalité néonatale (NN)	22	26	31	27	27	36	24	33	27	23	33	29	25	35
Mortalité infantile ($_1q_0$)	27	43	52	41	49	47	40	48	33	45	55	47	40	53
Mortalité infanto-juvénile ($_5q_0$)	34	55	73	51	80	60	55	64	51	89	71	64	74	78
CONTRACEPTION														
Prévalence contraception total	45,1	28,0	16,8	26,4	13,6	24,1	34,4	21,2	28,0	22,0	10,4	22,8	11,3	21,8
Prévalence contraception moderne	42,3	26,7	15,3	25,2	13,3	22,2	33,7	19,4	27,3	21,1	10,2	22,1	11,1	20,5
Besoins non satisfaits en matière de planification familiale	13,4	23,3	27,6	23,2	20,2	24,6	19,9	24,1	25,1	25,6	36,7	21,1	26,7	24,1
SANTÉ DE LA RÉPRODUCTION														
Naissances des trois dernières années ayant eu lieu dans un établissement de santé (%)	95,8	88,0	78,2	76,4	52,1	78,1	88,4	72,0	81,2	64,1	69,0	65,8	48,2	59,4
Naissances des trois dernières années ayant été assistées par un prestataire formé (%)	95,3	71,1	69,5	68,6	43,9	61,2	78,1	65,3	70,9	41,0	60,9	39,3	41,0	49,5
SANTÉ DES ENFANTS														
Enfants 6-59 mois avec anémie (%)	57,4	68,5	72,0	64,6	83,0	75,6	71,5	75,1	80,0	74,8	73,5	75,4	85,7	75,1
Enfants 6-59 mois avec anémie sévère (%)	0,5	0,9	2,9	1,2	7,9	5,2	1,1	3,0	4,5	2,8	2,9	4,7	7,3	2,9
Enfants 12-23 mois avec tous les 8 vaccins recommandés (%)	84,9	80,9	68,2	80,6	47,0	79,7	83,4	67,8	76,6	63,7	68,7	76,6	33,6	74,2
NUTRITION														
Enfants de moins de 5 ans avec retard de croissance (%)	7,0	16,3	14,8	17,0	26,0	18,4	12,7	16,1	13,6	31,6	19,7	25,8	28,8	26,6
Enfants de moins de 5 ans émaciés (%)	4,9	5,2	8,7	9,2	10,2	9,9	9,9	13,8	12,6	5,9	15,0	10,6	7,5	10,1
Enfants de moins de 5 ans avec insuffisance pondérale (%)	6,5	10,2	13,7	16,2	21,2	17,7	11,3	17,5	16,1	18,3	22,4	17,7	21,9	22,5
PALUDISME														
Ménages possédant au moins une MII[2] (%)	66,4	48,7	94,8	90,2	67,2	94,2	85,5	89,7	95,7	45,5	95,1	88,9	56,5	64,4
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une MII[2]	42,6	28,8	66,7	61,2	24,0	78,4	65,4	60,1	77,4	20,7	73,3	46,1	25,7	41,4
Femmes enceintes ayant dormi sous une MII[2]	42,6	28,8	66,7	61,2	24,0	78,4	65,4	60,1	77,4	20,7	73,3	46,1	25,7	41,4
Prévalence du Paludisme TDR—Enfants 6-59 mois	0,2	0,0	0,2	0,0	4,8	1,8	0,0	0,0	0,4	2,9	0,1	0,2	15,3	0,2
Prévalence du Paludisme Microscopie—Enfants 6-59 mois	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	2,9	0,2	0,1	7,3	0,0
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ENQUÊTÉE														
Femmes 15-49 ans sans instruction (%)	22,9	23,3	69,5	43,6	64,0	53,7	42,2	63,6	45,9	62,3	62,8	78,1	57,0	54,8
Hommes 15-49 ans sans instruction (%)	17,4	12,4	62,6	42,5	46,8	39,0	32,9	55,1	32,1	47,1	59,0	79,0	27,4	39,8

[1] Basé sur les enfants nés au cours des dix années ayant précédé l'enquête ; [2] MII = Moustiquaire imprégnée d'insecticide